

**抗ヒスタミン薬
(第二世代)**

推奨度	薬剤名	特徴	1日薬価 (円)
第1推奨薬	フェキソフェナジン錠 60mg	妊婦授乳婦に対して安全に投与可能 運転等の操作について注意喚起を促す記載がない 1日2回製剤	20.2
条件付き 推奨薬	ベポタスチン ベシル酸塩OD錠10mg	肝機能低下患者に対して投与可能 妊婦授乳婦に対する投与は有益性投与 運転等の操作については注意 1日2回製剤	23.0
	エピナスチン錠 20mg	高度腎機能低下及び透析患者に投与量調整不要 妊婦授乳婦に対する投与は有益性投与 運転等の操作については注意 1日1回製剤	15.8

参考文献

1. 鼻アレルギー診療ガイドライン2024年度版
2. アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021年度版
3. 腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK 第3版. じほう. 2020.
4. 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015年度版
5. 妊娠と授乳 改訂3版. 南山堂. 2021.
6. 国立成育医療研究センターHP <https://www.ncchd.go.jp/kusuri/lactation/index.html>
7. 腎機能別薬剤投与量POCKETBOOK第4版.じほう.2022.
8. 内服薬 経管投与ハンドブック 一簡易懸濁法可能医薬品一覧一 第4版.じほう.2020.
9. 抗ヒスタミン薬効力比較
10. FINDAT（医薬品情報プラットフォーム）第二世代抗ヒスタミン薬 薬効群比較レビューVer.7
11. JUS-DI
12. 各薬剤添付文書
13. 各薬剤インタビューフォーム

改正履歴

2025/3/6

新規（運用開始）