

**抗ヒスタミン薬
(第二世代)**

| 推奨度 | 薬剤名 | 特徴 | 1日薬価 (円) |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------|
| 第1推奨薬 | フェキソフェナジン錠 60mg | 妊婦授乳婦に対して安全に投与可能 運転等の操作について注意喚起を促す記載がない 1日2回製剤 | 20.8 |
| 条件付き 推奨薬 | ベポタスチン ベシル酸塩OD錠10mg | 肝機能低下患者に対して投与可能 妊婦授乳婦に対する投与は有益性投与 運転等の操作については注意 1日2回製剤 | 21.4 |
| | エピナスチン錠 20mg | 高度腎機能低下及び透析患者に投与量調整不要 妊婦授乳婦に対する投与は有益性投与 運転等の操作については注意 1日1回製剤 | 14.5 |

参考文献

1. 鼻アレルギー診療ガイドライン2024年度版
2. アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021年度版
3. 腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK 第3版. じほう. 2020.
4. 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015年度版
5. 妊娠と授乳 改訂3版. 南山堂. 2021.
6. 国立成育医療研究センターHP <https://www.ncchd.go.jp/kusuri/lactation/index.html>
7. 腎機能別薬剤投与量POCKETBOOK第4版.じほう.2022.
8. 内服薬 経管投与ハンドブック 一簡易懸濁法可能医薬品一覧一 第4版.じほう.2020.
9. 抗ヒスタミン薬効力比較
10. FINDAT（医薬品情報プラットフォーム）第二世代抗ヒスタミン薬 薬効群比較レビューVer.7
11. JUS-DI
12. 各薬剤添付文書
13. 各薬剤インタビューフォーム

改正履歴

2025/3/6

新規（運用開始）